UNDE DIRECȚIONEAZĂ PLANTA ENERGIA?

În prima etapă alegem: înrădăcinare, fructe sau plante noi.

SOIURI REMONTANTE

Albion • San Andreas • Monterey



- La plantele recent instalate și slab înrădăcinate, primele flori pot fi îndepărtate temporar.
- Scop: rădăcini mai puternice și o plantă mai echilibrată.



LLOSANA – SOI UNIFER



- Nu îndepărta automat primele flori.
- La un soi unifer, acestea pot reprezenta o parte importantă din recolta principală.

STOLONII CONSUMĂ ENERGIE



- În cultura pentru fructe, stolonii se îndepărtează regulat.
- La soiurile remontante, formarea stolonilor poate reduce înflorirea și producția.

CULTURĂ PENTRU FRUCTE



- Păstrează florile după înrădăcinare.
- Elimină stolonii.



CULTURĂ PENTRU MULTIPLICARE



- Păstrează stolonii sănătoși.
- Reducerea fructificării este normală.

CÂND PĂSTRĂM PRIMELE FLORI?

- rădăcini noi, albe



- frunză centrală în creștere



- coroană fermă



- *plantă bine hidratată*



NU FOLOSI O REGULĂ FIXĂ PENTRU TOATE SOIURILE

Decizia depinde de tipul soiului, categoria plantei și starea culturii.



O plantă bine înrădăcinată poate susține mai bine recolta.

Respectă drepturile de multiplicare ale soiurilor protejate.

Recomandări pentru 10–1.000 de plante

www.capsuni.eu

Agro TIPS



🍓🌱 PRIMELE FLORI ȘI STOLONII UNDE DIRECȚIONEAZĂ PLANTA RESURSELE?

După plantare, căpșunul trebuie să susțină simultan mai multe procese: formarea rădăcinilor, dezvoltarea frunzelor, înflorirea, creșterea fructelor și, în anumite perioade, producerea stolonilor.
Apa, elementele nutritive și produșii fotosintezei sunt distribuiți între aceste organe. Dacă planta este încă slab înrădăcinată, menținerea simultană a florilor, fructelor și stolonilor poate încetini instalarea culturii.
De aceea, înainte de a elimina sau păstra primele flori, trebuie stabilit obiectivul:

✅ înrădăcinare și construirea plantei;
✅ producție de fructe;
✅ obținerea plantelor-fiice prin stoloni.

SOIURILE REMONTANTE

Soiurile remontante cu zi neutră, precum **Albion, San Andreas și Monterey**, pot forma flori și fructe în mai multe valuri pe parcursul sezonului, atunci când condițiile de temperatură, lumină, apă și nutriție sunt favorabile.
La plantele recent instalate și slab înrădăcinate, primele flori pot fi îndepărtate temporar pentru ca planta să direcționeze mai multe resurse către:

- formarea rădăcinilor noi;
- dezvoltarea frunzei centrale;
- consolidarea coroanei;
- creșterea suprafeței foliare;
- pregătirea următoarelor valuri de fructificare.

Îndepărtarea florilor nu trebuie realizată însă după o regulă rigidă. O plantă viguroasă, bine hidratată și bine înrădăcinată poate susține primele flori mai repede decât o plantă mică, deshidratată sau afectată la nivelul rădăcinilor.
Decizia depinde de:

- soi;
- categoria și calibrul plantei;
- tipul materialului săditor;
- momentul plantării;
- starea sistemului radicular;
- vigoarea plantei;
- obiectivul culturii;
- condițiile de temperatură și lumină.
-

⚠️ **Simpla apariție a florilor nu confirmă înrădăcinarea.**

O plantă FRIGO poate porni în vegetație și poate înflori folosind o parte din rezervele acumulate în coroană, chiar dacă rădăcinile noi sunt încă insuficient dezvoltate. Evaluarea trebuie făcută după starea întregii plante, nu numai după prezența florilor.

LLOSANA – SOI UNIFER EXTRA-TIMPURIU

La un soi unifer, precum **Llosana**, primele inflorescențe pot reprezenta o parte importantă din recolta principală.
Din acest motiv:
❌ nu îndepărtați automat primele flori;
❌ nu aplicați regula folosită pentru soiurile remontante fără evaluare;
❌ nu eliminați inflorescențele doar pentru că au apărut repede după plantare.
La soiurile unifere, eliminarea primelor flori poate însemna eliminarea directă a unei părți din producția planificată.
Intervenția poate fi justificată numai în situații speciale, precum:

- plante foarte slabe sau grav deshidratate;
- sistem radicular compromis;
- plantare tardivă ori necorespunzătoare;
- simptome de putrezire;
- obiectiv tehnologic diferit de producția imediată de fructe.
-

STOLONII CONSUMĂ RESURSE

Stolonul este un lăstar specializat prin care planta formează o plantă-fiică. Pe măsură ce aceasta se dezvoltă, planta-mamă îi furnizează apă, elemente nutritive și asimilate.
Într-o cultură destinată fructelor, menținerea unui număr mare de stoloni poate conduce la:

- reducerea resurselor disponibile pentru flori și fructe;
- îndesirea culturii;
- aerisire mai slabă;
- creșterea umidității în interiorul vegetației;
- concurență pentru apă și elemente nutritive;
- lucrări de întreținere și recoltare mai dificile.

La soiurile remontante, formarea intensă a stolonilor poate concura direct cu înflorirea și fructificarea.

✂️ **În cultura pentru fructe, stolonii se îndepărtează regulat.**

Tăierea se face:

✅ cât timp stolonii sunt încă tineri;
✅ cu o foarfecă sau un instrument curat;
✅ fără tragere și fără smulgere;
✅ fără rănirea coroanei plantei-mamă;
✅ fără deteriorarea pețiolurilor și a inflorescențelor.

Nu lăsați stolonii să formeze plante-fiice mari înainte de eliminare. Cu cât sunt întreținuți mai mult timp, cu atât consumul de resurse este mai mare.

CULTURĂ PENTRU FRUCTE

Dacă obiectivul este producția de căpșuni:

- urmărim mai întâi înrădăcinarea;
- păstrăm florile atunci când planta le poate susține;
- eliminăm temporar florile plantelor remontante slabe;
- păstrăm cu atenție inflorescențele soiurilor unifere;
- tăiem regulat stolonii;
- menținem cultura aerisită și uniformă;
- adaptăm apa și nutriția la încărcătura de fructe.

O plantă bine înrădăcinată poate susține mai uniform înflorirea, legarea și creșterea fructelor.

CULTURĂ PENTRU MULTIPLICARE

Dacă obiectivul este obținerea plantelor-fiice:

- se păstrează stolonii sănătoși;
- fructificarea se reduce sau se gestionează separat;
- plantele-mamă trebuie să fie sănătoase și corect identificate;
- se urmărește starea fitosanitară a fiecărei plante;
- plantele cu simptome de boli sau dăunători nu se folosesc pentru multiplicare.

⚠️ Plantele-fiice pot transmite mai departe agenți patogeni, acarieni, nematozi și viroze provenite de la planta-mamă.

Pentru soiurile protejate, multiplicarea nu este automat permisă. Trebuie respectate drepturile titularului soiului, condițiile de licență și legislația aplicabilă materialului de înmulțire.

CÂND POATE PLANTA SĂ PĂSTREZE PRIMELE FLORI?

Căutăm simultan mai multe semne favorabile:

✅ rădăcini noi, albe sau crem-deschis;
✅ frunză centrală nouă, în creștere;
✅ coroană fermă, fără necroze;
✅ plantă bine hidratată;
✅ creștere vegetativă echilibrată;
✅ absența ofilirii persistente;
✅ sol umed și aerat, fără băltire.

În schimb, dacă planta are rădăcini brune sau moi, coroana afectată, frunze centrale deformate ori ofilire persistentă, prioritatea nu este fructificarea, ci identificarea și corectarea cauzei.

⚠️ NU FOLOSIȚI O REGULĂ FIXĂ PENTRU TOATE SOIURILE

„Eliminăm primele flori” nu este o recomandare universală.

Pentru soiurile remontante slab înrădăcinate poate fi o măsură temporară utilă. Pentru un soi unifer extra-timpuriu, cum este Llosana, aceeași intervenție poate reduce direct recolta principală.

Decizia corectă se bazează pe:

soi + tipul plantei + momentul plantării + starea rădăcinilor + obiectivul culturii.

✅ În cultura pentru fructe păstrăm florile pe care planta le poate susține și eliminăm stolonii care îi consumă resursele.

✅ O plantă bine înrădăcinată poate susține mai bine recolta.

🌐 www.capsuni.eu

AgroTips – informații practice pentru rezultate mai bune.

#AgroTips #Căpșuni #FloriȘiStoloni #SoiuriRemontante #Albion #SanAndreas #Monterey #Llosana #Înrădăcinare #CulturaCăpșunului #CapsuniEu